

# Alergias



## Descrição

- Pulgas (lesões normalmente em região sacral): Advantage Max 3 a cada 21 dias
- Alimentar (lesões normalmente em abdômen)
- Atopia: pode ser necessária pulsoterapia com cefalexina ou corticóide

## Prescrição Medicamentosa

- Antipulgas
- Com piodermite:
  - Cefalexina: 20 – 30mg/kg TID ou BID, VO (Cefalexina humana: 250, 500mg; Suspensão humana: 250mg/5ml; Rilexine vet: 75, 300 ou 600mg; Celesporim vet 150, 600 mg; Pet Sporin vet 75, 300mg)
  - Enrofloxacino: 2,5 – 5 mg/kg, BID (Baytril vet 50 ou 150mg)
  - Amoxicilina + Clavulanato: 10 a 20 mg/kg, BID (Synulox vet 50, 250 mg; Amoxicilina + Clavulanato humano: 500mg; Suspensão humana: 125mg/ml)



# Alergias



- Antibiótico por, no mínimo, 21 dias
- Convenia: aplicação a cada 15 dias
- Com prurido excessivo:
  - Depomedrol: 1ml/40kg
  - Dexametasona: 0,25 a 1,25 mg/animal, SID (Dexametasona hum: 0,5, 0,75, 4 mg; Aziumvet: 0,5 mg)
  - Prednisona: 0,5 - 1 mg/kg BID (Meticorten hum/vet 5, 10, 20mg)
  - Vitaminas:
    - Óleo de peixe: 1000mg/5kg (Farm. Hum: 500 e 1000mg)
    - Allerdog Plus (w3 e w6)
    - Pelo e derme 750, 1500 (w3 e w6)
    - Dermocanis (1 cápsula para cada 10 kg)
    - Anti-histamínico: Clemastina: 0,05 - 0,1 mg/kg, BID (Alergovet C vet - 0,7 e 1,4mg)



- Para estimular imunidade:
  - Infervac
  
- Apoquel Zoetis Dermatológico para Cães:
  - Tratamento do prurido associado à dermatites alérgicas em cães. Tratamento das manifestações clínicas de dermatites atópicas em cães.
  - A dose inicial recomendada é de 0,4 a 0,6 mg/kg de Oclacitinib, administrado oralmente, duas vezes ao dia, por 14 dias. Para a terapia de manutenção (após os 14 dias iniciais), a mesma dose deve ser administrada (0,4 a 0,6 mg/kg), uma vez ao dia. A necessidade da terapia de manutenção de longa duração deve ser baseada numa avaliação de risco-benefício individual, realizada pelo médico veterinário responsável. Apoquel pode ser administrado junto com alimento ou separadamente.



- Cytopoint é um anticorpo monoclonal (mAb) que objetiva e neutraliza especificamente a IL-31 canina
  - A IL-31 é uma importante citocina na dermatite atópica canina envolvida no envio do sinal da coceira para o cérebro.
  - Por ser altamente direcionado a uma citocina específica envolvida na dermatite atópica canina, Cytopoint causa impacto mínimo sobre as funções imunes normais.
  - Cytopoint é eliminado por meio das vias normais de degradação de proteínas da mesma maneira que os anticorpos de ocorrência natural; o metabolismo não envolve o fígado ou rins.
  - Cytopoint interrompe o ciclo da coceira, fazendo com que os cães parem de se coçar e permitindo a cicatrização da pele ferida.





# Alergias



- Danos à Epiderme: *A barreira enfraquecida torna o cão mais vulnerável à entrada trans epidérmica de alérgenos, desta forma reativando e perpetuando o ciclo da coceira.*
  - Dose mínima de 2 mg/kg, SC

## Observações

- Dieta de Eliminação - USP (hipoalergênica)
  - *Constituintes básicos*: Carne de carneiro, coelho / Arroz integral (macrobiótico), batatas / Óleo de milho ou canola / Água mineral (dessedentação e preparo do alimento).
  - *Proporções*: 1-2 partes de carne para 4 partes de arroz ou batatas, refogado ou adicionando a cada xícara de arroz 1 colher das de chá de óleo.
  - *Laxativo*: Lactulona
  - *Jejum prévio*: 24 - 48h de duração



# Alergias



## - Cuidados gerais:

- A dieta é constipante – ofereça água à vontade, forneça alimento bem úmido e não deixe de utilizar o óleo.
- Não dar: carne de boi / vaca, frango, peixe (vermelho), ovos, maionese, leite, vegetais (legumes, verduras), frutas, óleo de soja, amendoim, girassol, oliva, ossos, farináceos, margarina, manteiga, cremes, miúdos (bofe, fígado, rim, etc.), doces de qualquer tipo, rações comerciais, enlatados, embutidos, frios, queijos.
- Todos os familiares (principalmente idosos e crianças), empregados, tratadores, treinadores do ambiente doméstico, canis/gatis, clínicas e hotéis devem ser conscientizados para seguir à risca a dieta, de, no máximo, 2 meses de duração.
- Cuidado com animais que viram lixo ou têm acesso a sobras.
- Evitar que eles cacem e, principalmente, comam a presa.



# Alergias



- Cuidado com tecoterapia
- Siga à risca todas as recomendações ou nem comece a dieta
- Shampoos/ Sprays / Pomadas
  - Cloresten (clorexidine /miconazol): malassezia, piодermite secundária a atopia
  - Micolytic (miconazol): dermatofitose, malassezia
  - Pertopic (peróxido de benzoila): dermatite seborreica primária e piодermite secundária a demodicose
  - Sebotrat S (ácido salicílico / enxofre): seborreia seca
  - Sebotrat O (S + alcatrão): seborreia oleosa
  - Peroxidex (bactericida) – Farmácia humana: seborreia oleosa bacteriana
  - Hexadene (antibacteriano)
  - Cortishamp (hidrocortisona): DAAP, Atopia





# Alergias



- Neodexa (corticoide): spray e pomada
- Sebotrat F (ácido láctico + gérmem de trigo + glicerina): atopia, pele ressecada ou sensível
- Cetoconazol (antifúngico)
- Sabonete Soapex (antibacteriano)
- Proderm: hidratante
- Humilac: para pelo ressecado
- Pomada Lamisil (antifúngico)
- Dermolene (Bact, fungo, AI) – também em spray

