

Colapso de Traqueia Canino

Exames de Imagem

- Diagnóstico: Raios-X

Tratamento Ambulatorial

- 1) Oxigenioterapia
- 2) Acesso venoso
- 3) Sedação, se necessária:
 - *Morfina*: 0,25 a 0,5 mg/kg, IM, SC
 - *Acepromazina*: 0,01 a 0,1 mg/kg, IV, IM, SC
 - *Diazepam*: 0,2 a 0,6 mg/kg, IV
 - *Butorfanol*: 0,1 a 0,2 mg/kg, IV
- 4) Fluidoterapia
- 5) Corticoide para reduzir a inflamação:
principalmente se associado a dispneia intensa ou bronquite crônica
 - *Dexametasona*: 0,5 a 2 mg/kg, IV
 - *Succinato de Prednisolona*: 30 a 50 mg/kg, IV
 - *Prednisona*: 0,5 a 1 mg/kg, VO, BID



Colapso de Traqueia Canino



6) Broncodilatador, apesar do efeito limitado sobre vias aéreas inferiores

Droga	Cão	Gato
Aminofilina	6 a 10 mg/kg, SC, IM, VO QID ou TID	4 a 8 mg/kg, SC, IM, VO, BID (cautela em cardiopatas)
Terbutalina	1,25 a 5 mg, VO, TID ou BID ou 0,01 mg/kg, SC, a cada 4h	0,625mg, VO, TID, ou 0,1 mg/kg, SC, a cada 4h
Teofilina	4 a 8 mg/kg, VO, QID ou TID	4 a 8 mg/kg, VO, QID ou TID
Teofilina (longa duração)	10 a 25 m/kg, VO, BID	25 mg/kg, VO, SID (noite)
Albuterol	0,02 a 0,05 mg/kg, VO, TID	0,02 a 0,05 mg/kg, VO, TID ou 200 µg/gato (inalação)



Colapso de Traqueia Canino

7) Clearance das secreções respiratórias:

- Manutenção da *hidratação*
- Utilização de *umidificadores ou vaporizadores*
- *Tapotagem*
- *Nebulização* com 35% de álcool etílico



