

Demodicose Canina – Sarna Demodécica



Descrição

- Ácaro (*Demodex canis*) vive no folículo piloso (intra folicular)
- Todo animal tem o ácaro (recebe após o nascimento e mamada), mas o sistema imune controla – fatores hereditários: def. Linfócito T
- Surto juvenil: secundário ou espontâneo
- Surto adulto: secundário

Quadro Clínico

- Sinais clínicos: alopecia, foliculite, piodermite secundária (só então ocorre prurido) – início na cabeça e extremidades



Demodicose Canina – Sarna Demodécica



Diagnóstico Laboratorial

- Exame parasitológico por raspado cutâneo (profundo)
- Histopatológico se folículo muito profundo

Prescrição Medicamentosa

- Ortodoxo: Peróxido de Benzoíla 2,5% e Triatox 4ml/L de água, banhos cada 7 dias
- Heterodoxo: banhos Peróxido de Benzoíla 2,5% cada 5 - 7 dias, Ivermectina oral 0,6mg/kg cada 24h, Moxidectina oral (Cydectin 1%) 0,5 - 1mg/kg cada 72h
- Tópico: Peróxido de benzoíla 2,5% (Peroxidex®), banhos 2x por semana, ensaboar por 10min e secar.
Se tiver piodermite secundária: antibióticos
- Moxidectina – Cydectin NF 1%® (1g/100ml): 0,5 - 1mg/kg cada 72h, SC ou VO
 - *Efeitos colaterais*: sensibilidade no local da aplicação, prostração, hipotermia, reação farmacodérmica (nódulo ulcerado)



