

Distocia

Descrição

- Cães: Frequência cardíaca normal do feto é 170 a 230 bpm
- Gatos: Frequência cardíaca normal do feto é 190 a 250 bpm
- Considera-se sofrimento fetal: 150 a 160 bpm

Quadro Clínico

- Indicações de Distocia:
 - Gestação prolongada (mais de 70 dias) sem início de trabalho de parto
 - Diminuição de temperatura corpórea com período superior a 24 a 36h, sem início de trabalho de parto
 - Dor intensa, sinais de alteração sistêmica ou toxemia materna
 - Inquietação, choro e lambedura constante da vulva



Quadro Clínico

- Indicações de Distocia:

- Secreção vaginal esverdeada (indica separação placentária) ou eliminação de fluidos fetais sem nascimento de filhotes após 2 horas
- Sangramento vaginal
- Contrações fortes e regulares sem nascimento de filhotes em 30min
- Contrações fracas e irregulares sem nascimento de filhotes em 4 horas
- Intervalo entre nascimento dos filhotes superior a 4 horas
- Filhote retido no canal do parto
- Não nascimento de todos os filhotes no período de 18 a 24 horas (em gatas 24 a 36 horas)



Tratamento Ambulatorial

- Estimular a fêmea a caminhar, subir e descer escadas, defecar e urinar poderá induzir contrações uterinas
- Toque digital da parte dorsal da vagina também estimula
- Nos casos de inércia uterina em que não há evidências de obstrução ou hiperdistensão uterina e o tamanho dos fetos e da pelve se apresentam normais, o tratamento médico pode ser empregado:
 - *Fluidoterapia* com solução salina e glicose
 - *Ocitocina*:
 - ◆ Cadela: 5 a 20U, não excedendo 20 U/animal, IM
 - ◆ Gata: 2 a 4U, IM
 - Pode causar contrações não efetivas, tetania uterina e diminuição do fluxo sanguíneo fetal
 - Repetir a cada 30min (máximo de 3 aplicações)



Tratamento Ambulatorial

- Infusão contínua na mesma dosagem, diluída em 250ml de solução fisiológica glicosada pode diminuir os efeitos colaterais
- Gluconato de Cálcio a 10% em animais com hipocalcemia (50 a 100 mg/kg) ou não responsivos a Ocitocina
- Administração lenta e com monitorização cardíaca
- Não administrar SC



Distocia

Tratamento Ambulatorial

- Cesariana – Protocolo anestésico:
 - MPA: Butorfanol (0,1 a 0,2mg/kg)
 - Nalbufina (0,1 a 1mg/kg)
 - Tramadol (2mg/kg)
 - Indução: Etomidato (0,5mg/kg) associado com Midazolam (0,5mg/kg)
 - Propofol (2,5 a 6mg/kg)
 - Manutenção: Isoflurano
 - Sevoflurano
 - Associado a Fentanil ou Remifentanil
 - Epidural: Lidocaína (3,1 a 3,6mg/kg) associada com morfina (0,1mg/kg) ou Fentanil (2µg/kg)



Distocia

Protocolo UNESP Botucatu



