

# Hepatite Infecciosa Canina



## Descrição

- DNA vírus
- Desinfetantes: sensível a iodóforos, fenólicos e hidróxido de sódio
- Vias de eliminação: urina (9 meses a 1 ano), fezes, saliva

## Quadro Clínico

- 7 a 30 dias de idade: morte súbita
- 30 a 90 dias: maior incidência da doença clínica
- Até 1 ano: extremamente rara a doença clínica
- Febre: 40° a 40,5°, anorexia, sede, congestão de mucosas, congestão de tonsilas e faringe, conjuntivite, petéquias e sufusões na mucosa bucal



# Hepatite Infecciosa Canina



## Quadro Clínico

- Linfadenopatia cervical, quadro respiratório, diarreia com ou sem sangue, vômitos, hepatomegalia, convulsões (encefalopatia hepática), aumento tempo de coagulação, icterícia rara (animal que sobrevive 5 a 7 dias), ceratite (olho azul – sequelado subclínico)

## Diagnóstico Laboratorial

- Patologia clínica: proteinúria, anemia, linfopenia, trombocitopenia, aumento de ALT e FA

## Tratamento Ambulatorial

- Fluidoterapia + Vitamina C
- Transfusão de sangue fresco
- Vitamina K
- Glicose
- Antibiótico: Ampicilina ou Ceftriaxona
- Terapêutica ocular: colírio sem cortisona

