



## Tratamento Ambulatorial

- Tratamento queimadura de primeiro grau:
  - *Controle da dor:* opioides e AINEs, compressas úmidas frias, cremes a base de corticoides
  - *Higienização das feridas (após tricotomia e analgesia):* PVPI degermante ou Clorexidina (pode ser usada na higienização diária das feridas)
- Tratamento queimaduras de segundo e terceiro graus:
  - *Controle da dor:* Morfina, Tramadol, Butorfanol
  - Acesso venoso para fluidoterapia – tratamento de choque de acordo com a perda hídrica
  - Suporte nutricional – dietas hiperproteicas e hipercalóricas – utilização de clara de ovo



## Tratamento Ambulatorial

- Tratamento da sepse:

- *Estágio 1:* do momento do atendimento até 36h:

- ◆ Monitorar níveis séricos de Potássio (hipercalcêmica associada com destruição celular) – corrigir se necessário

- ◆ Monitorar débito cardíaco

- ◆ Monitorar valores de hematócrito (valor ideal 30%) – se necessário realizar transfusão sanguínea

- ◆ Monitorar níveis séricos de proteínas: abaixo de 3 g/dl, instituir infusão de plasma fresco ou solução coloides

- ◆ Como antibióticos sistêmicos têm penetração tissular reduzida nas áreas queimadas, a terapia tópica com medicamentos antibióticos deve ser imediatamente instituída. Gentamicina, Polimixina, Neomicina e Bacitracina

- ◆ Aloe Vera para manutenção da vascularização da derme



## Tratamento Ambulatorial

- Tratamento da sepse:

- *Estágio 2: 36 horas pós atendimento até o sétimo dia:*

- ◆ Transição da fase de choque para a fase hipermetabólica
    - ◆ Problemas respiratórios – antibioticoterapia com base em cultura e antibiograma de secreções
    - ◆ Instabilidade hemodinâmica
    - ◆ Dor e ansiedade do paciente e dos proprietários – opioides, benzodiazepínicos – evitar

fenotiazínicos como Acepram.

- ◆ Fluidoterapia: Glicose 5% e Ringer lactato

- Avaliar débito urinário, pressão arterial, valores albumina e hematócrito



## Tratamento Ambulatorial

- Tratamento da sepse:
  - *Estágio 3: após a primeira semana de terapia:*
    - ◆ Septicemia e choque séptico em pacientes gravemente comprometidos
    - ◆ Aporte nutricional adequado
    - ◆ Síndrome da insuficiência respiratória aguda
- Terapia tópica das lesões tegumentares oriundas de queimaduras
  - ◆ Curativo: debridamento da ferida, troca do agente tópico e observação diária da lesão.
  - ◆ Sulfadiazina de Prata a 1% + Nitrato de Cério + Acetato de Sulfonamida a 10% (Mafenida)
  - ◆ Nitrato de Prata a 0,5%

